

WIRTAS

Sommerdinkel



- Erste Sommerdinkel-Sorte in Europa
- Gesund auf dem Feld – gesund auf dem Teller
- Hoher Ertrag – geringer N-Bedarf
- Hoher RP- und Feuchtkleber-Gehalt
- **Geeignet auch für die Spätherbstaussaat**

| | Einstufung durch BSA [züchtereigene] | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Ährenschieben | (6) | mittel – spät |
| Reife | (6) | mittel – spät |
| Pflanzenlänge | (6) | mittel – lang |
| Neigung zu Lager | (6) | mittel – hoch |
| Fußkrankheiten | (4) | gering – mittel |
| Neigung zu Auswuchs | (3) | gering |
| Mehltau | (3) | gering |
| Blattseptoria | (5) | mittel |
| Braunrost | (5) | mittel |
| Ährenfusarium | (3) | gering |
| Spelzenbräune | (3) | gering |
| Feuchtkleber | (9) | sehr hoch |
| TKM | (5) | mittel |
| Kornertrag 1 [unbehandelt] | (6) | mittel – hoch |
| Kornertrag 2 [behandelt] | (6) | mittel – hoch |

Sehr geringe Akkumulation von Schwermetallen
und Pflanzenschutz-Rückständen



WIRTAS

Sommerdinkel



Anbauhinweise:

Saatzeit: März – April oder auch schon im November

Saatstärke: Richtwerte!

| kfk./m ² | Standort und agronomische Bedingungen | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| | gut | weniger gut |
| früh | 250 | 300 |
| mittel | 275 | 325 |
| spät | 300 | 350 |

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen zur N-Düngung und zum Wachstumsreglereinsatz mit uns!

Regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!



WIRTAS bei Aussaat im November vs. Frühlingsaussaat Bildmitte



Danko Saatzucht Deutschland GmbH
Badelebener Str. 12
39393 Ausleben OT Üplingen

www.danko-saatzucht.de

