

SOPOT

Wechseltriticale



- Spitzen-Ertrag und Standfestigkeit
- Sehr gute Gesundheit, speziell in Bezug auf DTR, Braun- und Gelbrost, sowie Ährenfusarium
- Beste Standfestigkeit sowie Resistenz gegen Blatt- und Ährenseptoria unter allen Sommertriticale-Sorten
- Hoher Proteingehalt bei mittlerem TKM

Einstufung durch COBORU*

Ährenschieben		mittel
Gelbreife		mittelspät
Pflanzenlänge		kurz
TKM		mittel
Auswuchsfestigkeit	5	
Standfestigkeit	7.7	
Rohproteingehalt	5	
HI-Gewicht	6.0	
Rynchosporium	7.4	Hohe Noten sind bei COBORU* gut!
Mehltau	7	
Blattseptoria	7.4	
Ährenseptoria	7.6	
DTR	8	
Fußkrankheiten	7.9	
Gelbrost	7.9	
Braunrost	8	
Ährenfusarium	8.5	

*COBORU = polnisches Sortenamt



SOPOT

Wechseltriticale



Anbauhinweise:

Saatzeit: Frühjahrs- aber auch späte Herbstaussaat

Saatstärke: In Abhängigkeit von Saatzeit, Standort, agronomischen Bedingungen und Produktionsziel (Mähdrusch/GPS):
380 – 480 kfk/m²

Empfohlen auch für schwächere Standorte!

Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** (bitte jeweils neueste ggf. regionale Richt- und Grenzwerte beachten!): Betonte Start- und Schoßgabe.

Sehr gute Standfestigkeit ermöglicht (in Abhängigkeit von Bestandsentwicklung und Produktionsziel: Mähdrusch/GPS) den Verzicht auf **Wachstumsregler**

Fungizide: Je nach Befalls-Situation, jedoch macht sich die hohe Grundgesundheit bezahlt

Insektizide: Nach Befalls-Situation mit jeweils zugelassenen Präparaten

Herbizide: Alle zugelassenen Präparate (keine Unverträglichkeiten bekannt)

Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!



Danko Saatzucht Deutschland GmbH
Badelebener Str. 12
39393 Ausleben OT Üplingen

www.danko-saatzucht.de

