

KASYNO

Wintertriticale



- International erfolgreiche Sorte aus dem Hause DANKO
- Zulassungen in PL, F und GB
- Hohertragreich, kurz und winterhart
- Gute Blatt- und Ährengesundheit

| | Einstufung durch BSA (züchtereigene) | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Ährenschieben | 6 | mittel – spät |
| Reife | 6 | mittel – spät |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 6 | mittel – hoch |
| Auswinterung | (2) | [sehr gering – gering] |
| Mehltau | 5 | mittel |
| Blattseptoria | 3 | gering |
| Braunrost | 2 | sehr gering – gering |
| Gelbrost | 2 | sehr gering – gering |
| Ährenfusarium | (4) | gering – mittel |
| Bestandesdichte | 4 | gering – mittel |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| TKM | 8 | hoch – sehr hoch |
| Kornertrag 1 (unbehandelt) | 7 | hoch |
| Kornertrag 2 (behandelt) | 7 | hoch |



KASYNO

Wintertriticale



Anbauhinweise:

Saatzeit: Mitte September bis Anfang November

Saatstärke: Richtwerte!

| kfK./m ² | Standort und agronomische Bedingungen | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| Saatzeit | gut | mittel | grenzwertig |
| früh | 240 | 270 | 290 |
| normal | 270 | 300 | 330 |
| spät | 330 | 350 | 380 |

Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** (bitte jeweils neueste ggf. regionale Richt- und Grenzwerte beachten!): Betonte Schoßgabe + Spätgabe (mittlere Kornzahl je Ähre und hohes TKG).

Durchschnittlicher **Wachstumsreglereinsatz** – in Abhängigkeit von Standort und Wirtschaftsdüngereinsatz.

Fungizide: Bei frühem, hohem Befallsdruck – Mehltau beobachten

Insektizide: Nach Befallssituation mit jeweils zugelassenen Präparaten

Herbizide: Alle zugelassenen Präparate (keine Unverträglichkeiten bekannt)

Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!



Danko Saatzucht Deutschland GmbH
Badelebener Str. 12
39393 Ausleben OT Üplingen

www.danko-saatzucht.de

