

# MANDARYNA

Sommerweizen



- Runde A-Qualität
- Hohes hl-Gewicht bei mittlerer TKM
- Eignung für alle Anbaulagen, auch zur späten Herbstaussaat
- Gute Toleranzen gegenüber Mehltau, Braunrost, Fußkrankheiten und Fusarium

## Einstufung durch BSA (züchtereigene)

|                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Ährenschieben              | (4) | früh - mittel        |
| Reife                      | (4) | früh - mittel        |
| Pflanzenlänge              | (5) | mittel               |
| Neigung zu Lager           | (3) | gering               |
| Pseudocercospora           | (3) | gering               |
| Mehltau                    | (2) | sehr gering - gering |
| Blattseptoria              | (5) | mittel               |
| DTR                        | (5) | mittel               |
| Gelbrost                   | (4) | gering - mittel      |
| Braunrost                  | (2) | sehr gering - gering |
| Ährenfusarium              | (3) | gering               |
| Spelzenbräune              | (3) | gering               |
| Feuchtkleber               | (7) | hoch                 |
| hl-Gewicht                 | (9) | sehr hoch            |
| TKM                        | (5) | mittel               |
| Kornertrag 1 (unbehandelt) | (7) | hoch                 |
| Kornertrag 2 (behandelt)   | (7) | hoch                 |



# MANDARYNA

Sommerweizen



## Anbauhinweise:

**Saatstärke:** Richtwerte!

| kfK./m <sup>2</sup> | Standort und agronomische Bedingungen |        |             |
|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
|                     | gut                                   | mittel | grenzwertig |
| Saatzeit            |                                       |        |             |
| früh                | 330                                   | 350    | 350         |
| normal              | 350                                   | 380    | 380         |
| spät                | 400                                   | 450    | 500         |

Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** (bitte jeweils neueste ggf. regionale Richt – und Grenzwerte beachten!): Betonte Schoßgabe + Qualitätsgabe

Durchschnittlicher **Wachstumsreglereinsatz** – in Abhängigkeit von Standort und Wirtschaftsdüngereinsatz (in Vermehrungsbeständen empfiehlt sich CCC-Anwendung)

**Fungizide:** Blattseptoria und DTR beachten, Gelbrost in Befalls-Lagen

**Insektizide:** Nach Befalls-Situation mit jeweils zugelassenen Präparaten

**Herbizide:** Alle zugelassenen Präparate (keine Unverträglichkeiten bekannt)

**Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!**



Danko Saatzucht Deutschland GmbH  
Badelebener Str. 12  
39393 Ausleben OT Üplingen

[www.danko-saatzucht.de](http://www.danko-saatzucht.de)